

Explicación vacunas

- **Tuberculosis:** Principalmente en niños y en España en la actualidad se pone fundamentalmente a grupos de riesgo no a la generalidad aunque depende de la comunidad autónoma.
- **Triple vírica:** Sarampión, parotiditis y rubeola. Se pone normalmente a los 12 meses y a los 3 años, aunque depende de la comunidad autónoma.
- **Hepatitis B:** En adultos y niños (recién nacidos, 2 y 6 meses).
- **Tétanos difteria y tosferina:** Normalmente se pone a los 6 años.
- **Pentavalente:** Tétanos difteria, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b, Polivirus tipo I, II y III inactivados. (a los 2, 4, 6 y 15 meses habitualmente).
- **Tétanos, difteria:** Se pone en adultos, el tétanos ya no se pone solo en muchas comunidades.
- **Varicela (Zoster):** Solo se le pone a quien no ha pasado la enfermedad. En el calendario se suele incluir a los 12 años.
- **Hexavalente:** es la pentavalente con la hepatitis B. Se ha quitado en algunas comunidades, el objetivo era que los niños recibieran un pinchazo menos.
- **Encefalitis garrapatas:** La vacuna frente a la encefalitis transmitida por garrapatas o encefalitis centroeuropea está indicada para personas residentes en áreas endémicas, trabajadores de alto riesgo y viajeros a zonas forestales o rurales del centro-norte-este de Europa, incluida Alemania. El riesgo para los viajeros se presenta en las zonas endémicas, durante los viajes de verano, cuando se hacen excursiones o camping en áreas rurales o boscosas. Por tanto si se va a viajar a esas zonas.
- **Meningitis C:** En Adultos y niños (2, 4 y 15 meses).

Casi todas las vacunas contienen hidróxido de aluminio, con lo cual es importante seguir el protocolo de testaje que presentamos en esta misma página de descargas del test de vacunas.